L'anaplasmose chez le chien

Que faire avec le résultat de votre SNAP®

Résultat positif Le chien a été exposé et peut être infecté. Vérifiez pour des changements Que faire hématologiques (hématologie et frottis sanguin) et ensuite? des changements dans les protéines sériques. Les signes cliniques et Les sianes cliniques et les résultats de laboratoire les résultats de laboratoire Diagnostic* sont compatibles avec ne sont pas compatibles l'anaplasmose. avec l'anaplasmose. Généralement pas **Traitement** Doxycycline/tétracycline recommandé Évaluez le comptage plaquettaire dans 1 semaine: si aucune amélioration. investiguez pour d'autres conditions. Suivi Surveillez l'animal pour des signes cliniques éventuels. Retestez le niveau d'anticorps C, dans 6 mois pour vérifier la réponse au traitement et/ou voir s'il y a eu réexposition à des tiques infectées.

Résultat négatif Une infection est peu probable

- Révisez les avantages de la prévention des tiques
- Retestez dans 1 an

Discutez des stratégies de prévention de la maladie et renforcez l'importance d'une protection contre les maladies vectorielles.

^{*} Des tests diagnostiques supplémentaires pourraient être utiles. Voir la section « Sérologie et PCR pour les patients malades » du Guide de Référence du test SNAP® 4Dx® pour plus d'information.



