Test SNAP Giardia

Que faire avec votre résultat de test SNAP® Giardia

Résultat positif

Chez les chiens et les chats présentant des signes cliniques, *Giardia* peut être la cause de la diarrhée

Résultat négatif

Il est peu probable que *Giardia* soit la cause des signes cliniques

Vérifier pour des infections

Que faire ensuite?

Traitement

 Vérifier pour des infections parasitaires intestinales concomitantes en effectuant le test fécal oeufs et Parasites (OP) avec le test antigénique fécal : Profil Antigène Fecal Dx^{MC}—Code du test FDXP

_

- Traiter avec un médicament giardicide pour utilisation chez les chiens et les chats
- Laver l'animal infecté
- Décontaminer l'environnement de l'animal avec un désinfectant

parasitaires intestinales concomitantes en effectuant le test fécal oeufs et Parasites (OP) et le test antigénique fécal Profil Antigène Fecal Dx^{MC}—

 Vérifier pour les autres causes possibles de diarrhée en effectuant le bilan complet Diarrhée par RealPCR^{MC} Canin—Code du test CDCD Félin—Code du test FDCD

Code du test FDXP

Suivi

- Il n'est pas recommandé de répéter le test si les signes cliniques disparaissent
- Si les signes cliniques persistent, investiguer pour les autres causes de diarrhée en effectuant le Bilan Complet Diarrhée par RealPCR :

Canine—Code du test CDCD Feline—Code du test FDCD

V

Prévention

- Élimination appropriée des matières fécales de l'animal
- La vaccination contre Giardia n'est pas recommandée pour aucun animal

